新しい牛群検定成績表について(その44)

—もうひとつの夏季乳量減(出荷乳量)—

情報分析センター 次長 相原 光夫

残暑お見舞い申し上げます。今年の夏も大変暑く、ほとんどの農家で乳量が減少してしまっています。都府県において、夏季の乳量減は避けて通れないといっても過言ではありません。夏季の乳量減の原因は、もちろん夏の暑さです、牛が夏バテしてしまい、呼吸数が増えてしまうことに始まり、反芻が減り、粗飼料を食べなくなり、体力が低下し、乳量や乳成分が下がってしまいます。

夏バテによる乳量減については、これまでの連載の中でも何度も触れてきました。今回はこういった夏バテを踏まえた上で、夏季におけるもうひとつの乳量減を紹介します。例えば、「今年の夏は送風扇も増設しミストもつけた。実際に牛たちは好調で、餌もよく食べ夏バテの牛もいない。それなのに何故か、この夏の出荷乳量は全然伸びない?しかも、このクソ暑いのにヤタラと分娩が多くて忙しい!」みなさんの廻りにこういった事例はありませんか?根本的には暑熱対策という点で変わりはありませんが、新しい検定成績表の活用の一つとして紹介します。

1 牛群検定の集計からみる夏季の乳量減

(1) 搾乳牛1頭あたり乳量の推移

図1は、平成27年の牛群検定による北海道の搾乳牛1頭あたりの乳量の推移です。乳量の季節的变化は、北海道と都府県で全く異なります。北海道の季節変化は、夏至と冬至を基本とした日長時間(昼の長さ)に由来します。プロラクチンとは乳汁分泌に欠かせないホルモンです。光と強く関係しており日長時間が長くなるほどプロラクチンの分泌が促進され乳量も増加します。北海道の乳量の推移は、極めて自然な生理的なものと言えます。最低乳量の時期が冬至とちょっとずれて11月になっているのは、12月になると夕朝の搾乳時に点灯するからではないかと言われています。

図2の都府県の乳量の推移は、北海道と比較して明らかに異なります。最低乳量は8月を中心とした夏季となっています。本来なら、北海道と同様に6月まで乳量が伸びても良いはずなのですが、6月には乳量を落としてしまい、8月が底となり、その後に回復していくというパターンを毎年繰り返しています。平成27年において都府県では、過去最高乳量を記録しました。しかし、夏季の乳量減は従来と違いはありませんでした。

(2) 1戸あたり出荷量の推移

ここからは都府県に限定して夏季の乳量減を紹介していきます。図3は、平成27年の牛群検定による都府県の

図1

図2

1戸あたりの出荷量の推移です。都府県の1戸あたりの頭数規模は、平均で経産牛約46.6頭になります。グラフの形状を見ますと、図2の1頭あたりの乳量の推移とそっくり瓜二つとなっています。このことから、一般には、夏季の出荷量減少は、夏バテ等で牛一頭一頭の乳量が減ってしまうからだと言われています。もちろん、これは正しい見解ですが、原因はこれだけでしょうか?

図 3

図2において、最高乳量だった5月と最低乳量だった8月を比較してみます。5月の乳量は29.6kg、8月は27.9kgです。差は-1.7kg (▲5.74%) となります。同じことを図3の出荷量で見ると、5月の出荷乳量は1216kg、8月は1092kgです。差は124kg (▲10.20%) となります。1頭あたり乳量では▲5.74%の落ち込みだったものが、出荷量ではその二倍近い▲10.20%まで落ち込んでいます。出荷量という観点では、1頭あたり乳量の減少だけでは、出荷量の減少を半分しか説明できないことになります。農家にとって、また乳業メーカーにとっても、最も大切なのは出荷量ですから、このことは深く掘り下げて検討する必要があります。

(3) 搾乳牛頭数

結論を記しますと、出荷量が▲10.20%まで落ち込んだ原因は、搾乳牛頭数にあります。図4では5月の搾乳牛頭数は40.2頭、8月は38.3頭しかいません。頭数が少なければ、出荷量が減ってしまうことは当然です。検算してみますと、以下のようにほぼピッタリと出荷量と同じになりますので、夏季の乳量減は、1頭あたりの乳量と搾乳牛頭数の減が原因であると言えます。

$$5月 \quad 29.6\text{kg} \times (40.2\text{頭} \times 1.0215^{(注)}) \approx 1216\text{kg}$$

$$8月 \quad 27.9\text{kg} \times (38.3\text{頭} \times 1.0215) \approx 1092\text{kg}$$

「頭数が減れば、出荷乳量が減るのは当たり前」、「頭数が足りないんだから、初妊牛を導入するしかない」とお考えになる方もいらっしゃると思います。しかし、図4の当該月の経産牛頭数は5月46.8頭、8月46.2頭とほとんど変化していないのです。ですので、単純な頭数だけの問題ではありません。8月の搾乳牛頭数の減少が、何故発生してしまったかを突き止める必要があります。

図 4

(注) 係数1.0215について

農家内の経産牛の飼養頭数のうち何頭が検定に加入しているかを示す数値に牛群内検定実施率というものがあり、都府県では97.9%となっています。この牛群内検定実施率の逆数が1.0215 (1 ÷ 97.9% = 1.0215) です。牛群検定は経産牛全頭が100%検定加入することが原則です。しかし、搾乳している牛でも、淘汰が目前となっている牛などを早期に検定から除籍してしまう農家もあり97.9%となっています。牛群検定における出荷量は、検定牛の合計乳量ではありません。実際に出荷して乳量を出荷伝票を確認して検定時に報告することとなっています。そこで、本稿では係数1.0215を乗して頭数を補正しました。

(4) 分娩頭数

図4のような搾乳牛頭数となってしまった原因は月々の分娩頭数に起因します。図5に示したとおり5月前後の分娩頭数が極端に少ないことがわかります。その後8月まで徐々に分娩頭数が回復していきます。ここでちょっと錯覚しやすいのですが、5月に分娩する頭数が少ないということは経産牛はほぼ一定頭数ですから、3、4、5月ごろに乾乳している牛は少ないということです。搾乳牛は当然多いわけです。逆に、8月頃まで分娩頭数が多くなると言うことは、8月頃まで乾乳している牛が多いということで、搾乳牛は少なくなります。搾乳牛頭数の季節変化の原因は分娩頭数に原因があるわけです。

図 5

もうおわかりと思いますが、5月に分娩することは、人工授精を行った時期を逆算すれば、8月であることは明確です。8月の人工授精の成績が思わしくないことから5月の分娩頭数が極端に減っているわけです。そして、11月ごろになってやっと人工授精の成績も回復し、一斉に受胎するので、8月分娩が増えてしまうわけです。

(5) 平均搾乳牛日数

平均搾乳日数は、一頭一頭それぞれの分娩後日数(搾乳日数)を平均した値で、これまでの本連載の中でも取り上げてきたものです。平均搾乳日数が200日を越えるようでしたら、泌乳後期の乾乳に近い牛が沢山

図 6

いるということです。乳量の少なくなった牛が多いわけですから生産性が劣ってしまいます。目標値は160日になります。図6に都府県での平均搾乳日数の推移を示しました。5～8月ごろが220日を越えており、この時期の生産性が低いことを示しています。5月と8月の対比という見方ではほとんど大差はありませんが、2月が比較的良好となっています。原因はやはり前述の分娩頭数の季節変化にあります。8月に分娩頭数が増えるのであれば、6月頃は乾乳直前の牛が沢山いることとなります。また、5月の分娩頭数が少ないのであれば2月ごろは乾乳直前の牛は少ないこととなります。

(6) もうひとつの夏季乳量減

今回、サブタイトルであげた「もうひとつの夏季乳量減」とは、図7にまとめたとおり、更に1年前にさかのぼり昨年の夏季の暑熱により受けた繁殖悪化に起因する乳量減を意味します。繁殖による乳量減は、毎日の搾乳作業ではなかなか気づかないことが多いものです。冒頭であげたような十分な暑熱対策を行い、実際に牛たちの体調も良いのに何故か出荷量が伸びてこないといった時は、今回紹介した繁殖関係に課題があることもあります。

図 7

夏季(8月頃)の出荷乳量減少の原因

- ①今年夏の暑熱によるもの
 - ・夏バテ等による1頭あたり乳量の減少
 - ・体細胞数等の増加、周産期病
- ②昨年夏の暑熱によるもの
 - ・搾乳牛頭数の減少
 - ・泌乳後期の牛の増加

2 検定成績表のチェック

このように夏季の暑熱の影響は、昨年のも(繁殖)と今年のもの(乳量減)の二つから受けています。ここまで記した内容は都府県平均を使った解説ですから、実際の農家においてはもっと極端に強く影響

が出ていることがまれではありません。農家においても夏季の乳量減が昨年の繁殖の影響か、今年の夏バテの影響かを見極めて対策を取らなければなりません。

(1) 出荷量のチェック

図8は検定成績表の1枚目の一番上に表示されているものです。前述したように、牛群検定では出荷量を出荷伝票をみて報告することとなっています(※)。出荷乳量が過去1カ年と比較して図8のように大きく異なるときは、夏季に限らずその原因を突き止める必要があります。本例では▲28.4%も減少しているのです、この7月に何らかのトラブルが発生しています。

(※) 検定牛一頭一頭を積み上げたものが検定乳量です。出荷乳量と比較して、もし大きく異なり、その原因が不明な時は乳量計の検査を行う必要があります。

<補足> 表示されている期間についてよく質問がありますので、計算方法を記します。

- 今 月：検定が行われた平成28年8月の検定日成績
- 前 月：本例では平成28年7月の検定日成績
- 3カ月：本例では平成28年5月6月7月の検定日成績の平均
- 過去1カ年：本例では平成27年8月～平成28年7月の検定日成績の平均

図 8

出荷量のチェック

前回検定	今回検定	受付日	発行日	検定から
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	検定日
28 07 27	28 08 25	29 09 01	09 04	11

検定日成績	1 日 成 績				
	検定乳量	出荷乳量	搾乳牛頭数	乳代①	調整乳代②
今 月	402	400	145	49421	8990
前 月	417	410	158	47504	9796
3カ月	524	520	183	62472	11462
過去1カ年	552	559	185	63384	12159

「今月」を「過去一カ年」と比較すると、
差▲159kg、比28.4%

過去一カ年と比較すると、
差▲10,794円、比21.1%

(2) 夏季の成績をチェック

図8とは対象農家も時期も異なり関連はないのですが、図9を使って5月と8月を比較してみますと、1頭あたり乳量でそれぞれ33.6kgと27.7kgなので、その差は▲5.9kg(比▲17.6%)と大きなものです。このことから、すでに今年の夏季の影響を強く受けています。驚くべきは出荷量です。ここでは、暫定的に、(搾乳牛頭数×1頭あたり乳量)を出荷量と考えます。すると、図示したように、その差は▲1,008kg(比▲33.6%)にもおよびます。5月に3,058kgを出荷していた農家が、3カ月後の8月には2,050kgまで落ち込んだのではたまった

図9

移動 13ヶ月 成績	牛 群 構 成				検 定 日		検 定 日				
	経産牛	搾乳牛	搾乳日数	頭数	初産	離乳	標準乳量	乳量			
検定年月日											
27.03.10	93	81	88	184	9	3	5	102	36.9	34.0	
27.04.10	94	87	93	191	7	3	4	104	37.1	33.6	
27.05.12	95	91	96	207	3	2	3	99	37.4	33.6	
27.06.09	92	87	96	226				103	37.2	32.6	
27.07.08	90	76	89	230	4	1	1	100	33.7	28.5	
27.08.10	91	74	84	221	10	3	6	103	34.4	27.7	
27.09.08	91	77	83	220	9			5	100	34.3	27.9
27.10.08	88	80	89	214	8	2	2	103	37.1	31.1	
27.11.09	89	76	89	206	11	7	3	100	36.1	31.1	
27.12.09	92	77	87	190	8			3	103	38.3	33.3
28.01.13	90	78	85	192	12	5	5	99	34.8	30.6	
28.02.13	93	83	88	188	6	1	5	105	39.6	35.1	
28.03.11	93	86	91	174	3			100	37.5	34.0	
平均・計	90.4	80.8	89	206	90	27	42	103	36.5	31.7	
前年成績	93.2	84.1	90	211	78	25	40	103	37.7	32.4	

5月検定での出荷量: 3,058kg=91頭×33.6kg
8月検定での出荷量: 2,050kg=74頭×27.7kg

昨年の夏季の影響の仕方

ものではありません。その原因は、1頭あたり乳量だけでないことはもうおわかりだと思います。5月に91頭で搾っていたものが、8月には74頭まで減ってしまったことによります。その原因は、昨年の夏季の繁殖が暑熱により思うように進まなかつたことによります。

平均搾乳日数についても同様です。夏季である8月前後については220日を越えていて、泌乳後期の牛ばかりになっており生産性は高くありません。ここで注意点があります。3月の平均搾乳日数が174日となっており、目標の160日に近く改善が進んでいるかのように見えます。しかし、これは分娩頭数の季節的偏りによる一時的なものなので、だまされないように注意しないとイケません。平均搾乳日数の改善の進捗度合いは、その下にある年間の平均を前年と比較して判断します。この例では前年211日から206日ですから、まだまだ合格点には及んでいません。

3 夏季の分娩

本稿では、夏季の乳量減少をその前年の夏季の繁殖から解説しました。夏季における繁殖対策を十分に行い、本稿で取り上げたような5月と8月のような分娩の偏りができないことが理想です。前年の夏季といっても、結局のところは暑熱対策に違いはありません。夏季の繁殖対策は専門の研究もさかに行われ、本誌でも多数取り上げて紹介しているところです。そこで、夏季の繁殖対策については他に譲り、ここでは夏季における分娩の飼養管理の注意点について記したいと思います。本誌が発行される9月末から10月初めの頃には、この8月に発情を飛ばしてしまった牛の授精が始まると思います。受胎した場合は来年の夏が分娩予定となりますので、まさに今この時に授精している牛たちが対象です。

(1) 乾乳牛の暑熱対策

近年、アメリカのフロリダ大学から興味深い実験結果

が発表されました。「乾乳期のヒートストレスが次の泌乳期の乳量にどのような影響をおよぼすか」という実験で、具体的には、乾乳期の牛で暑熱対策を施した牛と、施さない牛を比較したものです。結果としては、暑熱対策をした牛の乾乳期での乾物摂取量が増えました。注目すべきは分娩後に同一環境に戻しても、乾乳期に暑熱対策を行った牛は乳量が平均で5kg/日も増えたというものです。しかも、分娩後の乾物摂取量は対象区と変わらないというのです。これを生理的に解釈すれば、乾乳期に暑熱対策を施すことで、乾物摂取量が増え、ルーメンの状態がよくなり、泌乳細胞も発達したということになります。

日本では、乾乳牛を使った図10のような実験について、昨年度開催した乳用牛ベストパフォーマンス実現セミナーで、京都大学大学院農学研究科久米新一教授よりご講演がありました。暑熱期に低栄養だった乾乳牛は、体脂肪燃焼により体温が40度まで上昇し分娩後も体調不良で泌乳量が低下するというものです。やはり、乾乳期であっても暑熱対策を施し、食い込めるようにすることの重要性を訴えています。

図10

平成27年度 乳用牛ベストパフォーマンス実現セミナー(福岡)
京都大学大学院農学研究科 久米新一教授 講演資料より引用(一部改変)

(2) 夏季分娩の意義

分娩後のエネルギー不足は、夏季に限らず問題ですが、夏季の場合は特にヒートストレスが加わり、深刻となります。これは農家が夏分娩を嫌がる理由の一つでもあります。乾乳牛への暑熱対策は、分娩後のヒートストレスを軽減し乳量や繁殖成績を改善する可能性をもつ新しい技術です。ベストパフォーマンスの実現のためにも是非試して頂きたいと思います。

また、分娩時期として5月分娩が良く、8月分娩が悪いという意味ではありません。安定的に生乳生産を行うためにはどちらも必要なことで、季節的に偏ってしまうことに課題があります。TPP問題等への対応が求められていますが、足腰の強い酪農業のためには、安定的な生乳生産はとても大切なことです。