

イージーブリードの挿入、抜去法

挿入法



1 イージーブリード、アプリケーター、消毒剤、潤滑剤、手袋を準備します。



2 アプリケーターのスリットからテールが出るようにイージーブリードを装着します。(イージーブリードにはホルモンが含まれていますので、手袋を装着してください。)



3 アプリケーターに装着されたイージーブリード。膈粘膜を傷つけないように先端に潤滑剤をつけます。



4 外陰部を清潔にし、挿入します。はじめはやや上方に向け、膈の上壁に沿わせるようにすると、スムーズに挿入できます。



5 子宮頸管部に接触するまで深く挿入し、グリップを握ってイージーブリードを留置します。



6 アプリケーターを引き抜く時は、イージーブリードを手前に引きずらないよう、まっすぐ引いてください。テール部分は写真のように外に出ています。




抜去法

テール部分を持ってゆっくりと引き抜きます。




発情周期の同調

正常な牛の発情周期においては、プロゲステロン濃度の急激な低下の後、卵胞発育、発情へと続く。



正常な発情周期を示す牛の血漿中プロゲステロン(P)濃度の推移

イージーブリードの挿入によりプロゲステロンの濃度が上昇し、一定に維持される。抜き取ると、自然の状態と同じように発情開始に先立ってプロゲステロン濃度の急激な低下が起こる。



イージーブリードを挿入した時の血漿中プロゲステロン濃度の推移

成分 1個中 プロゲステロン 1.9g を含有します。

効能・効果 牛の発情周期の同調、鈍性発情、卵巢静止

用法・用量 前回の発情周期に関係なく膈内に挿入し
 発情周期の同調 12～15日間
 鈍性発情 7日間
 卵巢静止 12日間
 膈内に留置しておくだけです。

包装 10個入



※獣医師の処方箋、指示に従ってご使用ください。
 ※別に本剤を膈内に挿入するための専用アプリケーター（挿入器具）を販売しております。