

田尻系

茂金系

藤良系

気高系

P黒827

百合茂  
(鹿児島・薩摩)  
黒原4086(88.8)平茂勝  
(鹿児島・薩摩)  
黒原2441(89.0)第20平茂  
(鳥取・八頭)  
ふくみ  
(鹿児島・曾於)気高  
(鳥取・鳥取)  
宝勝  
(鹿児島・鹿屋)いとほる3の3  
(島根・仁多)  
黒原1207612(85.2)  
黒高205850平茂勝  
(鹿児島・薩摩)  
黒原2441(89.0)第20平茂  
(鳥取・八頭)  
ふくみ  
(鹿児島・曾於)気高  
(鳥取・鳥取)  
宝勝  
(鹿児島・鹿屋)いとほる3  
(岐阜・加茂)  
黒1911834(81.0)  
黒高201076安福(岐阜)  
(兵庫・美方)  
いとほる  
(岡山・新見)安谷土井  
(兵庫・美方)  
糸藤(岡山)  
(岡山・吉田)

現場後代検定成績 (直接検定 1.42) ※全体成績は、BMS No.については総平均、その他形質は(去勢平均+雄平均)÷2

|     | 頭数  | 終了月齢 | 枝肉重量(kg) | ロース芯面積(cm) | バラの厚さ(cm) | 皮下脂肪厚(cm) | 歩留基準値 | BMS No. | 肉質等級4-5率    |
|-----|-----|------|----------|------------|-----------|-----------|-------|---------|-------------|
| 去勢  | 13頭 | 28.4 | 545      | 65         | 8.5       | 2.5       | 74.4  | 7.5     | 85% (11/13) |
| 雌   | 14頭 | 30.5 | 513      | 60         | 8.3       | 3.4       | 73.3  | 5.9     | 64% (9/14)  |
| 全体※ | 27頭 |      | 529      | 63         | 8.4       | 3.0       | 73.9  | 6.6     | 74% (20/27) |


発育関連形質 G育種価および後代の成績

| 後代数   | 生時体重(kg) |      |            | 在胎期間(日) |      |             |
|-------|----------|------|------------|---------|------|-------------|
|       | 育種価      | 正確度  | 後代の成績      | 育種価     | 正確度  | 後代の成績       |
| 雄 603 | -0.804   | 0.99 | 35.7 ± 5.1 | -10.922 | 0.99 | 283.8 ± 4.4 |
| 雌 134 |          |      | 33.5 ± 5.3 |         |      | 282.5 ± 4.9 |

百合勝安

ゆりかつやす

黒原5284(84.5)

FCMax  
エフシーマックス繁殖場所: (前橋種雄牛センター)  
生年月日: 平成20年6月24日  
個体識別番号: 0201598856  
繁殖者: 和泉 英富氏  
産地: 島根県仁多郡奥出雲町

| 枝肉形質 G育種価  |      |
|------------|------|
| 枝肉重量(kg)   |      |
| 育種価        | 正精度  |
| 81.156     | 0.99 |
| ロース芯面積(cm) |      |
| 育種価        | 正精度  |
| 1.237      | 0.99 |
| バラの厚さ(cm)  |      |
| 育種価        | 正精度  |
| 0.654      | 0.98 |
| 皮下脂肪厚(cm)  |      |
| 育種価        | 正精度  |
| 0.317      | 0.99 |
| 歩留基準値      |      |
| 育種価        | 正精度  |
| -0.674     | 0.99 |
| BMS No.    |      |
| 育種価        | 正精度  |
| 0.223      | 0.99 |

脂肪酸組成 G育種価および後代の成績

| 後代数 | MUFA割合(%) |      |       | オレイン酸割合(%) |      |       |
|-----|-----------|------|-------|------------|------|-------|
|     | 育種価       | 正確度  | 後代の成績 | 育種価        | 正確度  | 後代の成績 |
| 203 | -2.698    | 0.99 | 61.3% | -3.171     | 0.99 | 52.5% |



一般出荷

- 母の父 芳之國
- 母の母の父 茂勝栄
- 性別 去勢
- 枝肉重量 664.0kg
- ロース芯面積 81cm
- バラの厚さ 9.3cm
- BMS No. 12
- 格付 A-5

P黒1112

福華1  
(鹿児島・指宿)  
黒14279(85.5)平茂勝  
(鹿児島・薩摩)  
黒原2441(89.0)第20平茂  
(鳥取・八頭)  
ふくみ  
(鹿児島・曾於)気高  
(鳥取・鳥取)  
宝勝  
(鹿児島・鹿屋)ふくひめ1  
(福島・郡山)  
黒1951066(80.3)安福165の9  
(岐阜・高山)  
ひめなみ3  
(鳥取・出雲)安福(岐阜)  
(兵庫・美方)  
糸晴波  
(鳥取・倉吉)あつだ354  
(群馬・吾妻)  
黒2461237(80.5)安福久  
(栃木・那須)  
黒原4416(85.5)安福165の9  
(岐阜・高山)  
もとじろう  
(栃木・那須)安福(岐阜)  
(兵庫・美方)  
紋次郎  
(兵庫・美方)あつだ237  
(青森・十和田)  
黒原1535479(81.1)第1花国  
(青森・つがる)北国7の8  
(鳥取・大田)平茂勝  
(鹿児島・薩摩)

現場後代検定成績 ※全体成績は、BMS No.については総平均、その他形質は(去勢平均+雄平均)÷2

|     | 頭数  | 終了月齢 | 枝肉重量(kg) | ロース芯面積(cm) | バラの厚さ(cm) | 皮下脂肪厚(cm) | 歩留基準値 | BMS No. | 肉質等級4-5率     |
|-----|-----|------|----------|------------|-----------|-----------|-------|---------|--------------|
| 去勢  | 16頭 | 27.9 | 509      | 64         | 8.4       | 2.1       | 75.2  | 9.2     | 100% (16/16) |
| 雌   | 10頭 | 29.8 | 476      | 60         | 8.3       | 3.4       | 73.8  | 7.9     | 100% (10/10) |
| 全体※ | 26頭 |      | 493      | 62         | 8.4       | 2.8       | 74.5  | 8.7     | 100% (26/26) |


発育関連形質 G育種価および後代の成績

| 後代数  | 生時体重(kg) |      |            | 在胎期間(日) |      |             |
|------|----------|------|------------|---------|------|-------------|
|      | 育種価      | 正確度  | 後代の成績      | 育種価     | 正確度  | 後代の成績       |
| 雄 68 | -3.794   | 0.97 | 34.5 ± 4.3 | -4.877  | 0.98 | 287.0 ± 4.9 |
| 雌 48 |          |      | 33.0 ± 3.5 |         |      | 286.8 ± 6.3 |

福華鶴

ふくはなつる

黒15395(82.0)

FCMax  
エフシーマックスSort<sup>90</sup>繁殖場所: (盛岡種雄牛センター)  
生年月日: 平成29年1月1日  
個体識別番号: 1527438932  
繁殖者: 群馬県畜産試験場  
産地: 群馬県前橋市

| 枝肉形質 G育種価  |      |
|------------|------|
| 枝肉重量(kg)   |      |
| 育種価        | 正精度  |
| -0.610     | 0.93 |
| ロース芯面積(cm) |      |
| 育種価        | 正精度  |
| -7.394     | 0.93 |
| バラの厚さ(cm)  |      |
| 育種価        | 正精度  |
| 0.393      | 0.91 |
| 皮下脂肪厚(cm)  |      |
| 育種価        | 正精度  |
| -0.218     | 0.94 |
| 歩留基準値      |      |
| 育種価        | 正精度  |
| -0.496     | 0.94 |
| BMS No.    |      |
| 育種価        | 正精度  |
| 1.581      | 0.94 |

脂肪酸組成 G育種価および後代の成績

| 後代数 | MUFA割合(%) |      |       | オレイン酸割合(%) |      |       |
|-----|-----------|------|-------|------------|------|-------|
|     | 育種価       | 正確度  | 後代の成績 | 育種価        | 正確度  | 後代の成績 |
| 22  | -1.055    | 0.96 | 59.9% | -1.679     | 0.97 | 51.1% |



調査牛

- 母の父 勝忠平
- 母の母の父 安福久
- 性別 去勢
- 枝肉重量 450.0kg
- ロース芯面積 63cm
- バラの厚さ 8.6cm
- BMS No. 11
- 格付 A-5